



КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ

(КВЭ) - вирусная природно-очаговая инфекция, передающаяся клещами, с преимущественным поражением нервной системы, протекающая с лихорадкой, интоксикацией, иногда принимающая хроническое течение

Заражение КВЭ происходит с апреля по сентябрь, с весенне-летним пиком во время наибольшей активности перезимовавших клещей.

Как можно заразиться?

Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной.

в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках

при заносе клещей на одежде, с цветами, ветками и т. д.

при употреблении в пищу сырого молока и приготовленных из него продуктов (вирус может находиться в молоке)

Основные признаки болезни?

Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 30 дней.

озноб

сильная головная боль

Высокая температура 38-39⁰

Тошнота рвота

Мышечные боли

К заражению КВЭ восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

Способы защиты от клеща

- правильно одевайтесь
- брюки, заправленные в обувь или в носки; верхняя одежда, заправленная в брюки, плотные манжеты, головной убор.
- не сидите на траве
- сделайте прививку
- используйте репеллент



Если присасывание клеща все же произошло, первичную консультацию всегда можно получить по телефону **03**. Вне зависимости от того привиты Вы или нет против КВЭ, но если у Вас произошло присасывание клеща, то Вам необходимо обязательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью к врачу.